



120-125 днів | Середньостиглий

# МРЕКЛІПС

Середньостигле червоне сорго, придатне для раннього посіву

до 11%

Вміст білка на суху речовину

до 76%

Вміст крохмалю на суху речовину

без таніну

Вміст таніну

## Господарські ознаки:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Холодостійкість на ранніх етапах	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Посухостійкість до цвітіння	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Посухостійкість після цвітіння	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Стійкість до вилягання	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Потенціал урожайності	█	█	█	█	█	█	█	█	█

## Толерантність до шкідників та хвороб:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Попелиця біотипу С	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Просяний комарик	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Вугільна гниль	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Летюча сажка	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Несправжня борошниста роса	█	█	█	█	█	█	█	█	█

НАПІВВІДКРИТА ВОЛОТЬ

100-110 см


ЧЕРВОНІЙ КОЛІР ЗЕРНІВКИ

## Цілі використання:

★★ Харчові

★★ Кормові

★★★ Спирт



█ Рекомендовано

█ Рекомендовано за дотримання рекомендацій по строках посіву та густотах

## Норма висіву, тис. насінин/га:

	100	120	140	160
Північ	█	█	█	█
Центр	█	█	█	█
Південь	█	█	█	█

\* показники від 1 (погано) - до 9 (відмінно)